

## الأمراض الكبيبية الأولية عند الأطفال في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية

سوسن محمد جلاله، عواطف جمال

قسم التشريح المرضي، كلية الطب، جامعة الملك عبد العزيز

جدة - المملكة العربية السعودية

### ملخص

نورد من خلال هذه الدراسة خبرتنا حول الأمراض الكبيبية الأولية عند الأطفال في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية خلال فترة 18 عاماً (من 1988 إلى 2006م). بلغ مجموع الحالات المشخص لديها مرضى كبيبي بدئي 169 حالة. تراوحت فيها الأعمار ما بين 1 و18 عاماً. شكل الداء ذو التبدلات الطفيفة والتصلب البؤري القطعي أكثر الأشكال مصادفة (20,1% و19,5% على التوالي)، يليها التهاب كبيبات الكلى المساريقي التكاثري بالـ IgM في 14,8% والاعتلال بالـ IgA في 10,7% والتالي للعدوى في 9,5% والغشائي في 7,1% والتهاب كبيبات الكلى الغشائي التكاثري في 5,9%، النوع المساريقي التكاثري مع تآلق مناعي سلبي في 5,9%. وكانت الأشكال الأقل المصادفة من نوع المتلازمة الكلائية الولادية من النوع الفنلندي (2,4%) ومتلازمة آلبرت (2,4%) وداء الترسيبات الكثيفة (1,2%) والتهاب كبيبات الكلى المساريقي التكاثري مع ترسبات الـ IgG (0,6%). نستخلص من هذه الدراسة شيوع الإصابة بداء التبدلات الطفيفة والتصلب البؤري القطعي في الأمراض الكبيبية البدئية عند الأطفال.